

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11)

EP 1 136 487 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
26.09.2001 Patentblatt 2001/39

(51) Int Cl.7: **C07D 401/04, C07D 291/06,
C07D 275/06, A23L 1/236,
A61K 31/4427, A61K 9/00,
A61K 31/54, A24B 15/00**

(21) Anmeldenummer: 01105450.9

(22) Anmeldetag: 14.03.2001

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE TR**
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(72) Erfinder:
• **Burgard, Andreas, Dr.**
65929 Frankfurt am Main (DE)
• **Dörr, Margit**
67591 Hohen-Sülzen (DE)

(30) Priorität: 20.03.2000 DE 10013712

(74) Vertreter: **Schweitzer, Klaus, Dr. et al**
Patentanwaltskanzlei Zounek,
Industriepark Kalle-Albert,
Gebäude H391
Rheingastrasse 190-196
65174 Wiesbaden (DE)

(71) Anmelder: **Nutrinova**
Nutrition Specialties & Food Ingredients GmbH
65929 Frankfurt am Main (DE)

(54) **Nikotinsalze mit verbessertem Geschmack, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung als Antirauchmittel**

(57) Salze gebildet aus Nikotin und anionenbildenden Süßstoffen, wie z.B. Acesulfam oder Acesulfam-K, im molaren Verhältnis 1 : 1 oder 1 : 2, wobei die Süßstoffmoleküle gleich oder verschieden sein können, zeichnen sich durch einen angenehm süßen Ge-

schmack aus, der den Nikotingeschmack selbst nach einer langen Verweilzeit im Mund maskiert, und sind daher zur Herstellung von Zubereitungen, insbesondere Kaugummi, Kautabletten oder Komprimaten, geeignet, die zur oralen Verabreichung von Nikotin, z.B. bei der Entwöhnung vom Rauchen, verwendet werden können.

EP 1 136 487 A1

B schr ibung

[0001] Raucher gewöhnen sich durch kontinuierlichen Konsum von Zigaretten daran, regelmäßig Nikotin zu sich zu nehmen. Aufgrund der nachteiligen Auswirkungen des Rauchens auf die Gesundheit sind viele Raucher daran interessiert, das Rauchen aufzugeben.

[0002] Dieses Vorhaben scheitert in vielen Fällen aber daran, daß die regelmäßige Aufnahme von Nikotin bereits zu einer körperlichen Abhängigkeit geführt hat. Für eine langsame Entwöhnung sind verschiedene Wege vorgeschlagen worden, zum Beispiel Nikotin in Form imprägnierter Pflaster auf die Haut aufzubringen oder es oral z. B. über ein Kaugummi zuzuführen (US 5,488,962). Die Zufuhr über Kaugummi hat zusätzlich den Vorteil, daß die orale Aufnahme das Bedürfnis, an Zigaretten zu saugen, kompensiert.

[0003] Nikotin besitzt allerdings einen Geschmack, der bei alleiniger Aufnahme als unangenehm empfunden wird. Er wird in der Regel als scharf bis pfefferartig und bitter bezeichnet. Dieser unangenehme Geschmack beeinträchtigt die Akzeptanz von Kaugummi mit Nikotinzusatz, das zur Entwöhnung von Rauchen besonders in der Anfangsphase regelmäßig gekaut werden sollte. Um die Akzeptanz von Nikotin enthaltenden Kaugummis oder anderen Zubereitungen, die oral aufgenommen werden können, zu verbessern, besteht deshalb das Bedürfnis, den unangenehmen Geschmack des Nikotins zu verbessern oder zu maskieren.

[0004] Es hat eine ganze Reihe von Versuchen gegeben, den unangenehmen Geschmack des Nikotins zu überdecken. Der Einsatz von Aroma- und Geschmacksstoffen wie Pfefferminz- oder Erdbeeraromen führte bisher nicht zu befriedigender Maskierung des Nikotingeschmacks. Lediglich die Verwendung von Einschlußverbindungen, wie z.B. mit Cyclodextrinen (WO 97/41843) ist bisher geeignet, eine geschmackliche Verbesserung herbeizuführen. Solche Einschlußverbindungen führen allein aber nicht zu ausreichender geschmacklicher Akzeptanz, es müssen vielmehr zusätzliche Geschmacksstoffe, z.B. bei Kaugummi, verwendet werden.

[0005] Es wurde deshalb von den Herstellern von Nikotin-Kaugummis bereits versucht, den unangenehmen Geschmack des Nikotins durch Kombination mit Süßstoffen, meist Saccharin und/oder Acesulfam-K zu überdecken, die in die Kaugummigrundmasse eingearbeitet werden. Die Süßstoffe als solche können jedoch den Nikotingeschmack nicht maskieren, so daß der Nikotingeschmack während des Kauvorganges immer noch deutlich wahrnehmbar und mit jedem Kauvorgang deutlicher hervortritt.

[0006] Dieser Geschmackseindruck der oben genannten Mischungen kann durch einfache sensorische Versuche mit wäßrigen Lösungen nachvollzogen werden, da sowohl Nikotin als auch die Süßstoffe wasserlöslich sind. Dazu werden Lösungen von Nikotin mit verschiedenen Süßstoffen wie Acesulfam-K, Saccharin-Natrium oder Aspartam in Wasser hergestellt und einer Geschmacksprobe im Vergleich zu einer nikotinhaltigen, wäßrigen Lösung (10 mg Nikotin in 100 ml Wasser) unterzogen. Die verschiedenen Kombinationen von Nikotin mit den jeweiligen Süßstoffen und die entsprechenden Geschmackseindrücke sind in Tabelle 1 dargestellt.

Tabelle 1

Geschmackliche Prüfung der Kombination von Nikotin mit Süßstoffen					
Substanzen	mg gelöste Substanz in 100 ml Wasser				
Nikotin	10	10	10	10	10
Acesulfam-K	-	12	24	12	12
Saccharin-Na	-	-	-	15	-
Aspartam	-	-	-	-	15
Geschmack	sofort pfefferartiger, kratziger, langanhaltender unangenehm bitterer Geschmack	sofort pfefferartiger, kratziger, lang anhaltender unangenehm bitterer Geschmack mit begleitendem leichtem Süßgeschmack	sofort pfefferartiger, kratziger, langanhaltender unangenehm bitterer Geschmack mit begleitendem stärkerem Süßgeschmack	sofort pfefferartiger, kratziger, langanhaltender unangenehm bitterer Geschmack mit bitterem und süßem Nachgeschmack	sofort pfefferartiger, kratziger, langanhaltender unangenehm bitterer Geschmack mit begleitendem leichtem Süßgeschmack

[0007] Die Ergebnisse belegen, daß der unangenehme Geschmack des Nikotins durch einfachen Zusatz von den oben genannten Süßstoffen nicht wesentlich modifiziert werden kann. Deshalb besteht nach wie vor Bedarf, den un-

angenehmen Geschmack des Nikotin in Zubereitungen, die oral aufgenommen werden, insbesondere in Kaugummi während des Kauvorganges zu maskieren.

[0008] Die WO 99/04822 beschreibt 1:1 Salze aus einem Süßstoff und einem unangenehm schmeckenden Pharmazeutikum. Salze aus einem anionischen Süßstoff und Nikotin werden nicht beschrieben.

[0009] Die WO 00/12067 beschreibt 1:1 Salze aus Saccharin mit synthetischen nicht-alkaloidalen medizinischen organischen Basen. Salze aus einem anionischen Süßstoff und Nikotin werden nicht beschrieben.

[0010] Die EP-B 0 046 506 beschreibt Vincamin-saccharinat und dieses enthaltene Arzneimittel. Salze aus einem anionischen Süßstoff und Nikotin werden nicht beschrieben.

[0011] Es wurde nun gefunden, daß Nikotin aufgrund seines basischen Charakters mit anionenbildenden Süßstoffen, die in Form ihrer korrespondierenden Säure vorliegen, zu salzartigen Verbindungen reagieren kann.

[0012] Dabei gelingt nicht allein die Herstellung von Salzen aus einem Molekül Nikotin und einem Molekül Süßstoffen, sondern es lassen sich ebenso definierte Verbindungen aus einem Molekül Nikotin und zwei Molekülen Süßstoff herstellen, wobei sogar zwei verschiedene Süßstoffe eingesetzt werden können. Überraschenderweise zeichnen sich alle diese Verbindungen durch einen angenehmen Süßgeschmack aus, dem die unangenehmen Komponenten des Nikotins weitgehend fehlen. Sie bestehen lediglich aus Komponenten, die z.B. in nikotinhaltigen Kaugummis ohnehin verwendet werden und machen weitere Arbeitsschritte wie die Herstellung der in der WO 97/41843 genannten Einschlußverbindungen überflüssig. Damit stellt diese Erfindung einen wesentlichen Fortschritt in der Herstellung, Zusammensetzung und Verwendung nikotinhaltiger Präparate zur Raucherentwöhnung dar.

[0013] Die vorliegende Erfindung betrifft somit Verbindungen oder Salze aus Nikotin und anionenbildenden Süßstoffen oder deren physiologisch verträglichen Salzen oder Süßstoffen, die in freier Form Säurecharakter besitzen, oder deren physiologisch verträglichen Salzen. Diese Verbindungen können auch als sog. Säureadditionssalze, bevorzugt mit HCl, oder anderen physiologisch verträglichen Säuren wie z.B. Essigsäure oder Schwefelsäure vorliegen.

[0014] Für die Herstellung dieser Verbindungen eignen sich grundsätzlich alle Süßstoffe oder deren physiologisch verträglichen Salze, wie insbesondere das Kaliumsalz des Acesulfams (Acesulfam-K), die Anionen zu bilden vermögen, dazu gehören insbesondere

Acesulfam und andere Oxathiazinonsüßstoffe

Alitام

Aspartam und aspartamähnliche Di- und Tripeptide

Cyclamat und andere Sulfamatsüßstoffe

Glycyrrhizin

Neotam

Saccharin

Gluconsäure

[0015] Acesulfam (Acesulfam-H) und Acesulfam-K sind besonders bevorzugt.

[0016] Dabei sind eine Vielzahl von Kombinationen, insbesondere bei den Verbindungen aus einem Molekül Nikotin und zwei Süßstoffmolekülen möglich. Durch geeignete Wahl der Süßstoffe läßt sich, insbesondere in Verbindungen mit zwei verschiedenen Süßstoffen überraschenderweise der Süßgeschmack, insbesondere die zeitliche Wahrnehmung der Süße modifizieren, zum einen im Hinblick auf die Maskierung des Nikotingeschmacks, zum anderen zur Einstellung eines optimalen Gesamtgeschmackeindrucks. Dies ist ein entscheidender Vorteil gegenüber den 1:1 Verbindungen aus 1 Mol Süßstoff und 1 Mol Nikotin.

[0017] Die vorliegende Erfindung betrifft somit auch ein Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemäßen Nikotin-Süßstoffverbindungen durch Umsetzung von Nikotin mit Süßstoffen in Form ihrer freien Säuren (z.B. Acesulfam-H) in einem geeigneten Lösungsmittel. Geeignete Lösungsmittel sind bevorzugt Wasser und/oder mit Wasser mischbare Lösungsmittel wie z.B. Alkohole. Für diese direkte Umsetzung geeignete Süßstoffe sind bevorzugt Acesulfam, Cyclamat, Glycyrrhizin, Gluconsäure und/oder Saccharin. Eine Verfahrensvariante besteht darin, daß man die Süßstoffe oder deren Salze (z.B. Acesulfam-K) mit Nikotin in einem wie oben beschriebenen Lösungsmittel in Gegenwart einer physiologisch unbedenklichen Säure, bevorzugt Salzsäure, oder anderen geeigneten anorganischen oder organischen Säuren wie z.B. Essigsäure oder Schwefelsäure umsetzt und die resultierenden Säureadditionssalze (vgl. z.B. Schema 1) der Nikotin-Süßstoffverbindungen isoliert.

[0018] Die Ausgangsstoffe für die Herstellung der erfindungsgemäßen Verbindungen sind im Handel erhältlich oder können nach literaturbekannten Methoden hergestellt werden; z.B. Acesulfam/Acesulfam-K vgl. EP-A 0 155 643.

[0019] Die Darstellung der Nikotin-Süßstoff-Verbindungen, Salze oder Addukte gelingt sehr einfach aus Lösungen, bevorzugt aus wässrigen Lösungen, des Nikotins und der entsprechenden Säure des jeweiligen Süßstoffes oder z.B. in einer salzsauren Lösung des jeweiligen Süßstoffes, wie in den folgenden Beispielen insbesondere für Acesulfam-H gezeigt wird. Die erhaltenen Reaktionslösungen werden in geeigneter Weise, z. B. im Vakuum vom Lösungsmittel befreit. Die Nikotin-Süßstoff-Verbindungen liegen laut ¹H-NMR als 1:1-, bevorzugt als 1:2- bzw. 1:1:1-Addukte vor. Für

die Herstellung von Verbindungen ohne zusätzlichen Salzgehalt (keine Säureadditionssalze) werden vorzugsweise die Süßstoffe eingesetzt, die in freier Form Säuren sind.

[0020] Die Erfindung betrifft weiterhin die Verwendung der genannten Verbindungen zur Herstellung von festen oder flüssigen Zubereitungen, die zur oralen Zufuhr von Nikotin, bevorzugt in Form von Kaugummi, Kautabletten, Komprimaten oder ähnlichen Zubereitungen, geeignet sind. Weiterhin werden allgemein Zubereitungen, die die erfindungsgemäßen Verbindungen enthalten, von der Erfindung umfaßt.

[0021] Die nachfolgenden Beispiele sollen die Erfindung näher erläutern, ohne dabei deren Umfang einzuschränken.

Beispiel 1

Herstellung eines 1:1-Salzes aus Nikotin und Acesulfam-H (vgl. Schema 1)

[0022] In 20 ml Wasser werden 20 mmol (3,244 g) Nikotin gelöst und mit 20 mmol (3,263 g) Acesulfam-H versetzt. Das Reaktionsgemisch wird anschließend im Vakuum eingeeengt. Es resultiert mit 100 % Ausbeute ein gelbbraungefärbtes Öl, welches laut $^1\text{H-NMR}$ als 1:1-Addukt vorliegt.

Beispiel 2


Herstellung eines 1:1:1-Salzes aus Nikotin, Acesulfam-H und Saccharin-H (vgl. Schema 2)

[0023] In 20 ml Wasser werden 20 mmol (3,244 g) Nikotin gelöst und mit 20 mmol (3,263 g) Acesulfam-H versetzt. Anschließend werden noch 20 mmol (3,664 g) Saccharin-H hinzugefügt. Das Reaktionsgemisch wird anschließend im Vakuum eingeeengt. Es resultiert mit 100 % Ausbeute ein gelbbraungefärbtes Öl, welches laut $^1\text{H-NMR}$ als 1:1:1-Addukt vorliegt.


Beispiel 3

Herstellung eines 1:2-Salzes aus Nikotin und Acesulfam-H (vgl. Schema 2)

[0024] In 20 ml Wasser werden 20 mmol (3,244 g) Nikotin gelöst und mit 40 mmol (6,526 g) Acesulfam-H versetzt. Das Reaktionsgemisch wird anschließend im Vakuum eingeeengt. Es resultiert mit 100 % Ausbeute ein gelbgefärbter amorpher Feststoff, welcher laut $^1\text{H-NMR}$ als 1:2-Addukt vorliegt.



Schema 1



Schema 2

[0025] Die verschiedenen Nikotin-Süßstoff-Verbindungen im molaren Verhältnis 1:1 und 1:2 bzw. 1:1:1 wurden in einem Geschmackstest im Vergleich zu einer wässrigen Nikotinlösung (10 mg Nikotin in 100 ml Wasser) sensorisch untersucht. Beispiel 4 zeigt die Ergebnisse solcher Prüfungen.

Beispiel 4

Nikotin-Süßstoff-Verbindungen im Verhältnis 1:1 und 1:2 bzw. 1:1:1

[0026]

mg gelöstes Addukt in 100 ml Wasser	Verbindung			
	1:1 Nikotin- Acesulfam-Salz 20	1:2 Nikotin- Acesulfam Salz 31	1:1:1 Nikotin- Acesulfam Saccharin-Salz 35	1:1:1 Nikotin- Acesulfam Aspartam-Salz 66
Geschmack	sofort süß, nach etwa 10 Sekunden paprikaartiger Geschmack, anschließend pfefferartig mild	sofort einsetzende deutliche Süße, lang anhaltend, anfangs sauer, kein Nikotingeschmack, nach 5 Minuten: kein Nikotingeschmack	sofort einsetzende, schwache Süße, metallischer, etwas bitterer Bei- und Nachgeschmack, nach 5 Minuten: kein Nikotingeschmack	sofort einsetzende, starke Süße, lang anhaltend, nach 5 Minuten: kein Nikotingeschmack

[0027] Die Ergebnisse belegen, daß, im Gegensatz zur einfachen Mischung des freien Nikotins mit Süßstoffen, der unangenehme Nikotingeschmack durch eine Salz- oder Adduktbildung des Nikotins mit Süßstoffen maskiert werden kann.

[0028] Während bei den 1:1-Addukten der Geschmack des Nikotins nach einer längeren Verweilzeit im Mund wieder erkennbar ist, kann der Nikotingeschmack bei den 1:2- bzw. 1:1:1-Addukten des Nikotins mit den jeweiligen Anionen der Süßstoffe überraschenderweise sogar gänzlich beseitigt werden, so daß selbst nach einigen Minuten Verweilzeit im Mund kein Nikotingeschmack feststellbar ist.

[0029] Die erfindungsgemäßen Verbindungen sind stabil und zerfallen auch bei der Einarbeitung in Kaugummi oder anderen zur Raucherentwöhnung geeignete Zubereitungen nicht.

[0030] Insbesondere können sie in Zwischen- oder Vorprodukten eingesetzt werden, ohne daß sich Nikotin und Süßstoffe entmischen. Sie lassen sich deshalb problemlos in die Zubereitungen einarbeiten, mit denen sie aufgenommen werden sollen, z. B. Kaugummi, Kautabletten, Komprimat oder andere Zubereitungen zur oralen Verwendung.

[0031] Die Anwendung wird durch die folgenden Beispiele erläutert.

Beispiel 5

Einarbeitung in Kaugummi

[0032] Zur Einarbeitung der erfindungsgemäßen Verbindungen in Kaugummi werden zuckerfreie Kaugummi-Streifen aus den allgemein bekannten Zutaten Kaumasse, zuckerfreien Süßungsmitteln wie Zuckeralkohole und Süßstoffe, Glycerin und Aromastoffen und den erfindungsgemäßen Verbindungen nach allgemein bekannter Technologie hergestellt, d.h. die Zutaten werden nacheinander in die erwärmte Kaumasse eingetragen und gleichmäßig eingearbeitet. Anschließend wird wie üblich ausgeformt und portioniert. Die Zutaten entsprechen den üblicherweise verwendeten, d.h. bei Zuckeralkoholen z.B. Sorbit, Xylit, Mannit, Maltit, Isomalt, Laktit, Erythrit, Mischungen aus Zuckeralkoholen und Zuckeralkohole in Sirupform, wie z.B. Sorbit-Sirup und Maltitsirup. Falls erwünscht, können zur zusätzlichen Aufsüßung der Kaugummis alle bekannten Süßstoffe eingesetzt werden, wie z.B. Acesulfam-K, Aspartam, Cyclamat, Saccharin, Thaumatin, Neohesperidine DC, Sucralose, Brazzein, Neotame.

[0033] Die Dosage der Nikotinsalze ist abhängig von der Menge an Nikotin, die in einem Streifen Kaugummi enthalten sein soll. Damit z.B. 2 mg Nikotin in einem Kaugummi-Streifen mit 3 g Masse enthalten ist, müssen 6 mg des beschriebenen 1:2 Salzes aus Nikotin und Acesulfamsäure eingesetzt werden oder aber 7,61 mg des beschriebenen Nikotin-Acesulfamsäure-Aspartam-Salzes. Analog kann die Dosage des Nikotin durch Erhöhung der Dosage der Nikotin-Salze erhöht werden.

[0034] Die Nikotin-Salze können ebenso in zuckerhaltige Kaugummi-Rezepturen eingearbeitet werden. Hierfür werden anstelle oder gemeinsam mit den Zuckeraustauschstoffen die üblicherweise verwendeten Zuckerstoffe wie z.B. Saccharose und Glukosesirup eingesetzt. Die so erhaltenen Kaugummi weisen einen angenehmen Süßgeschmack auf, der auch bei längerem Kauen nicht von bitteren Geschmackskomponenten abgelöst wird.

Beispiel 6

Einarbeitung in Komprimata, Tabletten oder Kautabletten

- 5 **[0035]** Zur Einarbeitung der erfindungsgemäßen Verbindungen in Komprimata werden zuckerfreie oder zuckerhaltige Komprimata, Tabletten oder Kautabletten unter Verwendung von zuckerfreien Süßungsmitteln wie Zuckeralkohole und Süßstoffe, Hilfsstoffen, Bindemitteln und Aromastoffen und den erfindungsgemäßen Verbindungen nach allgemein bekannter Technologie hergestellt, d.h. die Zutaten werden nacheinander homogen vermischt und zu Komprimaten verpresst oder Tabletten geformt. Die Zutaten entsprechen den üblicherweise verwendeten, d.h. bei Zuckeralkoholen
- 10 z.B. Sorbit, Xylit, Mannit, Maltit, Isomalt, Laktit und Erythrit und Mischungen aus Zuckeralkoholen. Bei zuckerhaltigen Komprimaten und Tabletten werden entweder ausschließlich oder in Kombination mit Zuckeralkoholen Zuckerstoffe wie z.B. Saccharose verwendet. Zur zusätzlichen Aufsüßung der Komprimata und Tabletten können alle bekannten Süßstoffe eingesetzt werden, wie z.B. Acesulfam-K, Aspartam, Cyclamat, Saccharin, Thaumatin, Neohesperidine DC, Sucralose, Brazzein, Neotame. Die Dosage der Nikotinsalze ist abhängig von der Menge an Nikotin, die in einem
- 15 Komprimat oder einer Tablette enthalten sein soll. Zur Dosage von 2 mg Nikotin müssen in ein Komprimat oder in eine Tablette 6 mg des beschriebenen 1:2 Salzes aus Nikotin und Acesulfamsäure eingesetzt werden oder aber 7,61 mg des beschriebenen Nikotin-Acesulfamsäure-Aspartam-Salzes. Analog kann die Dosage des Nikotin durch Erhöhung der Dosage der Nikotin-Salze erhöht werden.
- 20 **[0036]** Das so erhaltene Komprimat bzw. die Tablette weist einen angenehmen Süßgeschmack auf, der auch bei längerem Lutschen oder Kauen nicht von bitteren Geschmackskomponenten abgelöst wird.

Patentansprüche

- 25 1. Verbindung aus Nikotin, Süßstoff oder Süßstoffen und/oder deren physiologisch verträglichen Salzen und gegebenenfalls einer physiologisch verträglichen Säure.
- 30 2. Verbindung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, daß** Nikotin und Süßstoff im molaren Verhältnis von 1 : 1 oder 1 : 2 vorliegen, wobei die Süßstoffmoleküle gleich oder verschieden sein können.
- 35 3. Verbindung nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, daß** als Süßstoff Acesulfam oder andere Oxa-thiazinonsüßstoffe, Alitarn, Aspartam oder aspartamähnliche Di- und Tripeptide, Cyclamat oder andere Sulfamatsüßstoffe, Glycyrrhizin, Neotam, Saccharin oder Gluconsäure oder deren physiologisch verträglichen Salze verwendet werden.
- 40 4. Verbindung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet, daß** als Süßstoff Acesulfam oder Acesulfam-K allein oder in Kombination mit einem weiteren Süßstoff oder mit dessen physiologisch verträglichen Salz verwendet wird.
- 45 5. Verfahren zur Herstellung einer Verbindung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, indem man
- a) in einem geeigneten Lösungsmittel Nikotin mit einem oder 2 Süßstoffen, die gleich oder verschieden sein können, in Form ihrer freien Säure umsetzt und das gebildete Reaktionsprodukt gegebenenfalls isoliert, oder
- b) in einem geeigneten Lösungsmittel Nikotin mit einem oder 2 Süßstoffen, die gleich oder verschieden sein können, oder mit deren physiologisch verträglichen Salzen in Gegenwart einer physiologisch verträglichen Säure umsetzt und das gebildete Reaktionsprodukt gegebenenfalls isoliert.
- 50 6. Verfahren nach Anspruch 5, **dadurch gekennzeichnet, daß** Wasser und/oder mit Wasser mischbare Lösungsmittel als Lösungsmittel verwendet werden.
7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, **dadurch gekennzeichnet, daß** als physiologisch verträgliche Säure Salzsäure verwendet wird.
- 55 8. Verwendung einer Verbindung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4 zur Herstellung von festen oder flüssigen Zubereitungen, bevorzugt in Form von Kaugummi, Kautabletten oder Komprimaten, zur oralen Verabreichung von Nikotin.
9. Feste oder flüssige Zubereitung, bevorzugt in Form von Kaugummi, Kautabletten oder Komprimaten, zur oralen

EP 1 136 487 A1

Verabreichung von Nikotin, dadurch gekennzeichnet, daß sie eine Verbindung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4 enthält.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 01 10 5450

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
A,D	US 5 488 962 A (PERFETTI GEORGIO) 6. Februar 1996 (1996-02-06) * das ganze Dokument *	1,8,9	C07D401/04 C07D291/06 C07D275/06 A23L1/236 A61K31/4427 A61K9/00 A61K31/54 A24B15/00
A,D	WO 97 41843 A (AVANT GARDE TECHNOLOGIES & PRO) 13. November 1997 (1997-11-13) * Anspruch 12 *	1,8,9	
A,D	WO 99 04822 A (SERES ISTVAN ;CHINOIN GYOGYSZER ES VEGYESZET (HU); LEDNICZKY LASZL) 4. Februar 1999 (1999-02-04) * Ansprüche 1,23; Beispiele *	1,8,9	
A,D	WO 00 12067 A (SQUIBB BRISTOL MYERS CO) 9. März 2000 (2000-03-09) * Ansprüche 1,2 *	1,8,9	
A	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 101, no. 19, 5. November 1984 (1984-11-05) Columbus, Ohio, US; abstract no. 167543, TRENKER, ADY: "Sucking composition for stopping smoking" XP002170271 * Zusammenfassung * & BE 899 037 A (BELG.) 18. Juni 1984 (1984-06-18)	1,8,9	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7) C07D A23L A61K A24B
A,P	WO 00 35296 A (CORRIVEAU CHRISTINE L ;GREENBERG MICHAEL J (US); RUSSELL MICHAEL P) 22. Juni 2000 (2000-06-22) * Ansprüche 2,6,13 *	1,8,9	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 21. Juni 2001	Prüfer Bosma, P
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03.82 (P/4C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 01 10 5450

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obigen genannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

21-06-2001

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5488962 A	06-02-1996	IT 1243827 B	28-06-1994
		AT 96617 T	15-11-1993
		DE 69100589 D	09-12-1993
		DE 69100589 T	31-03-1994
		DE 480127 T	15-10-1992
		DK 480127 T	29-11-1993
		EP 0480127 A	15-04-1992
		ES 2032736 T	01-03-1993
		GR 92300082 T	30-12-1992
WO 9741843 A	13-11-1997	US 5866179 A	02-02-1999
		AT 200024 T	15-04-2001
		CA 2196150 A	04-11-1997
		DE 69704426 D	03-05-2001
		EP 0909166 A	21-04-1999
WO 9904822 A	04-02-1999	HU 9701293 A	01-02-1999
		AU 8553598 A	16-02-1999
		BG 104153 A	30-11-2000
		EP 1003557 A	31-05-2000
		HR 20000037 A	31-10-2000
WO 0012067 A	09-03-2000	AU 6021199 A	21-03-2000
		EP 1107738 A	20-06-2001
BE 899037 A	18-06-1984	KEINE	
WO 0035296 A	22-06-2000	WO 9823165 A	04-06-1998
		US 6165516 A	26-12-2000
		AU 1274597 A	22-06-1998
		AU 1338297 A	22-06-1998
		AU 719781 B	18-05-2000
		AU 1743297 A	22-06-1998
		EP 0969733 A	12-01-2000
		EP 0979039 A	16-02-2000
		EP 0967883 A	05-01-2000
		WO 9823166 A	04-06-1998
		WO 9823167 A	04-06-1998
		WO 0035298 A	22-06-2000
		AU 1937700 A	03-07-2000
		AU 2184300 A	03-07-2000
		WO 0035295 A	22-06-2000

EPO FORM P441

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

[The main body of the page contains extremely faint, illegible text that appears to be bleed-through from the reverse side of the paper. The text is too light to transcribe accurately.]